

¿QUÉ TIPO DE ATENCIÓN NECESITO?

En ocasiones debe tomar una decisión rápida respecto a dónde debe acudir para obtener atención médica.

¡Esta guía le ayudará a obtener la atención que necesita, cuando la necesita!

Si necesita ayuda, comuníquese con su unidad de diálisis durante el horario de operación.

En caso de duda, llame al 911



Afección, signos, síntomas	Médico de atención primaria	Centro de atención de urgencias	Departamento de Emergencias de un hospital
Absceso que debe drenarse (llaga dolorosa con pus)			❖
Reacción alérgica (hinchazón repentina de la cara o el cuello, problemas para respirar)			❖
Alergias (estacionales)	❖	❖	
Ataque de asma		❖	
Hemorragia que no se detiene			❖
Falta de aire			❖
Fractura de hueso		❖	
Fractura de hueso (si el hueso sobresale de la piel)			❖
Quemadura (menor)	❖	❖	
Quemadura (blanca o carbonizada – grave)			❖
Problema con un yeso (mojado o sucio)			❖
Dolor de pecho			❖
Resfriado	❖	❖	
Tos	❖	❖	
Corte (superficie de la piel – menor)		❖	
Corte (profundo, requiere sutura – grave)			❖
Deshidratación (debilidad, mareo, fiebre, dolor de cabeza, incapacidad para retener líquidos o alimentos)			❖
Diarrea	❖	❖	
Mareos (caídas, incapacidad para estar de pie)		❖	❖
Mordedura de perro		❖	❖
Dolor de oído	❖	❖	

¿QUÉ TIPO DE ATENCIÓN NECESITO? continúa

Afección, signos, síntomas	Médico de atención primaria	Centro de atención de urgencias	Departamento de Emergencias de un hospital
Desmayo			❖
Fiebre	❖	❖	
Dolor de cabeza	❖	❖	
Lesión de cabeza (sin perder el conocimiento)		❖	❖
Lesión de cabeza (con pérdida del conocimiento)			❖
Picadura de insecto	❖	❖	
Náuseas o vómitos	❖	❖	
Conjuntivitis	❖	❖	
Neumonía (tos persistente, falta de aire, fiebre, debilidad o dolor de pecho)			❖
Envenenamiento			❖
Sarpullido	❖	❖	
Crisis convulsiva (convulsiones o pérdida del conocimiento)			❖
Sepsis (confusión, falta de aire, frecuencia cardíaca acelerada, fiebre, dolor, piel fría o sudorosa)			❖
Dolor de garganta	❖	❖	
Esguince o distensión muscular	❖	❖	
Dolor estomacal intenso			❖
Ingestión de un objeto			❖
Infección urinaria (presión, dolor, sangre o micción más frecuente)	❖	❖	
Vómitos	❖	❖	
Cambios en el estado mental (confusión, desorientación, inseguridad de quién es o en dónde está)			❖



End-Stage Renal Disease
Network Program

Para obtener más información o para presentar una queja, comuníquese con nosotros

IPRO End-Stage Renal Disease Network Program

Corporate Office: 1979 Marcus Avenue, Lake Success, NY 11042-1072

Patient Services: (516) 231-9767 • Toll-Free: (800) 238-3773

Email: esrdnetworkprogram@ipro.org • Web: esrd.ipro.org