



# MI ELECCIÓN, LA DIÁLISIS PERITONEAL (DP)

## Mitos

y.

## realidades




¡Le dará una infección!

La peritonitis, una infección abdominal, puede prevenirse al seguir lo que le enseñaron durante la capacitación e informar de forma rápida al profesional de enfermería sobre cualquier preocupación. Las infecciones por el acceso de la hemodiálisis suelen ser más frecuentes y graves.



Para hacer DP en casa tendrá que deshacerse de sus mascotas.

Muchas personas hacen diálisis peritoneal (DP) en casa con sus mascotas. Hable sobre sus mascotas durante la capacitación en DP para aprender a prevenir infecciones. Mantenga limpia la zona de tratamiento y a las mascotas fuera de la habitación cuando se conecte y desconecte.



Si se ha sometido a una cirugía abdominal previa, no puede hacer DP.

Las cirugías abdominales de rutina, como la extirpación de la vesícula biliar y las cesáreas, no le impiden realizar la DP. Si se ha sometido a una cirugía abdominal y le interesa la DP, hable con su médico: es posible que aún sea candidato.



Si tiene problemas de visión o audición, no puede hacer DP.

Los dispositivos de asistencia pueden ayudar con la mayoría de las tareas de DP. Si le interesa la diálisis en casa, hable con un profesional de enfermería a domicilio. Ellos pueden enseñarle acerca de estos dispositivos y permitirle practicar la conexión y desconexión antes de comenzar la DP para ayudarlo a usted y a su médico a decidir si es adecuado para usted.



Es necesario tener cierta función renal para poder hacer la DP.

Siempre se comprobará la función renal, pero la DP puede realizarse sin ninguna función renal. La diálisis peritoneal se considera tan eficaz como la hemodiálisis a la hora de eliminar los productos de desecho de la sangre en la mayoría de las personas.



Si tiene sobrepeso, no puede hacer DP.

La DP puede hacerse de todos modos. El cirujano evaluará el mejor lugar para colocar el catéter en función de su forma y tamaño.

# MI ELECCIÓN, LA DIÁLISIS PERITONEAL (DP)

## Mitos


## y.

## realidades



No puede hacer DP si no cumple con el tratamiento en su centro de diálisis.

Cada individuo será evaluado, pero las personas con una gran necesidad de controlar las situaciones en realidad pueden estar mejor en casa.



Es necesario tener mucho espacio en casa para poder hacer la DP.

Se necesita algo de espacio para los suministros de DP, pero muchas personas que viven en apartamentos, remolques y otros espacios pequeños eficientes encuentran la manera de hacer que la DP funcione. Hable con un profesional de enfermería a domicilio si le interesa la DP pero le preocupa almacenar los suministros en su casa.



Solo hay un tipo de DP.

La DP implica la administración de un líquido especial en el abdomen, pero existen algunas opciones sobre cómo llevar a cabo el proceso, como de forma manual o automatizada (mientras duerme).



Cuando haga la DP, podrá comer y beber lo que quiera.

Sigue habiendo restricciones en la dieta y en el consumo de líquidos, pero tiene más opciones. Su dietista lo orientará.



Cuando haga la DP, podrá bañarse o ducharse.

El profesional de enfermería de DP le enseñará a cuidar de su catéter. Las duchas están permitidas, pero no puede bañarse ni sumergir el catéter bajo el agua. Si le gustan los baños, pregunte por un catéter preesternal que evite la inmersión. El profesional de enfermería también lo orientará sobre duchas seguras y responderá a sus preguntas sobre natación.



Para obtener más información o para presentar una queja, por favor, comuníquese con nosotros

**Programa de la Red de Enfermedades Renales en Etapa Terminal de IPRO**

Corporate Office: 1979 Marcus Avenue, Lake Success, NY 11042-1072

Servicios para pacientes:: (516) 231-9767 • Número de llamada g gratuita: (800) 238-3773

gestión de datos: (516) 268-6426 • Administración: (516) 686-9790

portal de soporte: [help.esrd.ipro.org/support/home](http://help.esrd.ipro.org/support/home) • Sitio web: [esrd.ipro.org](http://esrd.ipro.org)



adaptado de la red de Northwest Renal (red 16) y la red de Heartland Kidney (red 12). Desarrollado por las redes de enfermedades renales en etapa terminal (ESRD, por sus siglas en inglés) de IPRO de Nueva Inglaterra bajo contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Contract HHSM-500-2016-00019C

Este material fue preparado por el Programa de las ESRD de IPRO, compuesto por las ESRD de Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra, la región Atlántico sur y el valle del río Ohio, bajo contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), un organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Los puntos de vista expresados en este material no necesariamente reflejan los puntos de vista o las políticas oficiales de los CMS o del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), y cualquier referencia a un producto o entidad específica no constituye un respaldo de los CMS ni de HHS de dicho producto o entidad. Publicación n.º Publicación n.º ESRD.IPRO-G3-NW-20250604-475 v.1 6/17/2025 - LC